Broedvogels Huningaheerd in Eenrum (2023)

Albert-Erik de Winter & Addo van der Eijk

Rapport Wierde & Dijk 2024

Broedvogels Huningaheerd in Eenrum (2023)

In 2023 is het (boeren)erf van Huningaheerd in Eenrum geïnventariseerd op broedvogels. De inventarisatie vond plaats in het kader van het ervenproject Mooi Heem van agrarische natuurvereniging Wierde & Dijk.

Albert-Erik de Winter & Addo van der Eijk

Rapport Wierde & Dijk 2024

Wijze van citeren: Winter de A.E. & & A. van der Eijk, 2024. Broedvogels Huningaheerd in Eenrum (2023), Wierde & Dijk.

Foto omslag: Broedende meerkoet Hunningaheerd.

Foto's: Albert-Erik de Winter, tenzij anders vermeld.

Het project Mooi Heem is financieel mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van de provincie Groningen vanuit het programma Bos en Hout, gemeente Eemsdelta, gemeente Het Hogeland, Wierde & Dijk en Toukomst, een initiatief van het Nationaal Programma Groningen.

Inhoud

1. INLEIDING 3

2. BESCHRIJVING (BOEREN)ERF 4

3. WERKWIJZE EN WEERSOMSTANDIGHEDEN 4

4. RESULTATEN BROEDVOGELS 7

5. LITERATUUR 9

BIJLAGE 1: BROEDCODES 10

BIJLAGE 2: SOORT- EN TERRITORIUMKAARTEN 11

1. Inleiding

In 2023 is een broedvogelinventarisatie uitgevoerd op het (boeren)erf van Huningaheerd nabij Eenrum. Hierbij zijn alle waargenomen vogelsoorten integraal gekarteerd volgens de BMP-methode van Sovon. De inventarisatie vond plaats in het kader van Mooi Heem, het ervenproject van agrarische natuurvereniging Wierde & Dijk. Met het project vergroot Wierde & Dijk de biodiversiteit op Noord-Groninger erven en wordt de natuur op de erven in kaart gebracht. Deze en andere inventarisaties dragen bij aan het onder de aandacht brengen van de waarde en betekenis van boerenerven voor flora en fauna.

In dit rapport presenteren we de resultaten van de broedvogelkartering. Albert-Erik de Winter voerde de inventarisatie uit. De rapportage is opgesteld door Addo van der Eijk en Albert-Erik de Winter.

Wierde & Dijk is een vereniging voor natuur- en landschapsbeheer in Noord-Groningen. Zij verenigt streekbewoners die zich willen inzetten voor de bescherming van natuur en landschap in Noord-Groningen. Agrarische leden en burgerleden werken daarin samen. De afgelopen jaren heeft Wierde & Dijk zich ingezet voor projecten op het gebied van akker- en weidevogelbeheer, dijkbeheer, kolken, groene erven en agrarisch landschappelijk bouwen.

De Clereving-Meijer Stichting wordt bedankt voor de medewerking aan deze broedvogelinventarisatie en het beschikbaar stellen van het erf en de bijbehorende landerijen voor dit onderzoek.

2. Beschrijving (boeren)erf

Adres *: Oosterweg 13, 9967 TK Eenrum*
Geïnventariseerd oppervlakte *: 4,2 hectare*
Geïnventariseerde elementen *: Boerenerf*

Huningaheerd, ook Huninga genoemd, ligt ten noorden van Eenrum, tussen de dorpen Eenrum en Pieterburen (Figuur 1). De uit 1820 daterende kop-hals-rompboerderij is in 1938 naar plannen van J. Jans gemoderniseerd. Het schuurgedeelte en de bijschuur dateren uit omstreeks 1870. Voor de boerderij ligt een gazon met aan de zuidzijde een gracht. Achter de boerderij ligt een verhard erf, waarop meerdere schuren staan. Achter het erf ligt ook een paardenwas. Dit cultuurhistorisch element is in het verleden hersteld door Landschapsbeheer Groningen. Over het erf loopt het Pieterspad, een lange afstandswandeling tussen de Pieterburen en de St. Pietersberg. De Oosterweg loopt van zuid naar noord dwars over het erf. Op het erf zijn meerdere graslanden te vinden die omzoomd zijn door een windsingel met hoge oude bomen en dichte ondergroei met verschillende soorten struiken. Aan de noordzijde grenst het erf aan de Westernielandstermaar.

Figuur 1: Ligging van het op broedvogels geïnventariseerd (boeren)erf.

3. Werkwijze en weersomstandigheden

De broedvogelinventarisatie is uitgevoerd conform de richtlijnen van het Broedvogel Monitoring Project (BMP) van Sovon Vogelonderzoek Nederland (Vergeer et al. 2023). De BMP-methode heeft tot doel vast te stellen welke broedvogelsoorten en aantallen in een gebied voorkomen. Bij het BMP wordt een onderzoeksgebied meerdere keren in een seizoen bezocht. Het aantal bezoeken is afhankelijk van het landschapstype. Zo hoeft een kwelder minder vaak bezocht te worden dan een bosgebied. Het (boeren)erf staat binnen de BMP-methode niet als zodanig beschreven. Voor de opzet van de erfinventarisaties is gekozen voor 6 tellingen. De inschatting is dat dit aantal voldoende is voor het getalsmatig voorkomen van broedvogelsoorten en aantallen te kunnen vastleggen. Een nachtbezoek, onder meer voor uilen en rallen, is in

deze inventarisatie niet uitgevoerd. Omdat veel vogels zingen en actief zijn omstreeks zonsopgang, zijn de meeste tellingen zijn in de eerste uren na zonsopgang uitgevoerd.

	Bezoekdatum	Tijdstip
1.	26 maart 2023	07:30 t/m 08:30
2.	16 april 2023	08:15 t/m 08:55
3.	30 april 2023	06:30 t/m 07:15
4.	13 mei 2023	06:00 t/m 07:14
5.	24 mei 2023	06:00 t/m 07:15
6.	5 juni 2023	05:55 t/m 06:42

Tabel 1: Bezoeken aan erf.

Huningaheerd in Eenrum, 26 maart 2023

In het veld zijn de waarnemingen ingevoerd in de Applicatie Avimap, waarbij voor iedere waarneming soort, locatie, tijdstip en broedcode zijn vastgelegd, inclusief de door de waarnemer afgelegde route. De broedcodes staan in bijlage 1. Er bestaan 16 broedcodes, zoals ‘Baltsend paar in broedbiotoop’ (code 5) en ‘Nest met eieren’ (code 15). Hoe hoger de code, hoe groter de kans is dat de waarneming daadwerkelijk op een broedgeval wijst.

Na afloop van het veldwerk is het aantal territoria bepaald via het programma autoclustering van Sovon. Dit programma clustert alle waarnemingen op grond van vaste criteria. Voor elke vogelsoort gelden andere criteria. Zo verschilt de datumgrens per soort. Alleen waarnemingen

binnen de datumgrenzen worden meegerekend. Voor gele kwikstaart ligt de datumgrens bijvoorbeeld van 10 april tot 15 juli, voor winterkoning van 25 januari tot 15 juli. De automatische clustering is vervolgens door de waarnemer gecontroleerd.

Met het BMP-methode brengt Sovon ontwikkelingen van de aantallen en de verspreiding van de Nederlandse broedvogels in kaart. De methode maakt het mogelijk om trends in beeld te brengen. Dankzij het BMP is bekend of soorten de afgelopen jaren voor- of juist achteruit zijn gegaan. De voor dit project ingevoerde waarnemingen dragen bij aan het landelijke beeld van de Nederlandse broedvogels.

Het goed kunnen waarnemen van het aantal broedparen en de broedvogelsoorten hangt onder meer af van de weersomstandigheid tijdens een broedseizoen. Zo zijn vogels beter waar te nemen op windstille en zonnige dagen dan op dagen met harde regen en wind. In de rapportage over broedvogelinventarisaties wordt daarom altijd de weersomstandigheden beschreven.

Weer broedseizoen 2023

De lente van 2023 was zeer nat en vrij zonnig. De gemiddelde temperatuur in de lente kwam uit op 9,7°C tegen een langjarig gemiddelde van 9,9°C. April was een ruime graad te koel, mei week weinig af van het langjarige gemiddelde. De zeer natte lente met gemiddeld 205 mm (langjarig gemiddeld 148 millimeter) kwam vooral door maart en april. In maart viel bijna twee keer zoveel neerslag als normaal (98 mm, normaal 53 mm) Ook april was nat, er viel 66 millimeter tegen 40 millimeter normaal. De zonneschijn week weinig af van het langjarig gemiddelde. Maart was vrij somber, mei juist vrij zonnig. Het zonnige en droge weer in mei vormde de opmaat naar de eerste zomermaand. Juni was met 19,4 °C tegen normaal 16,2 °C de warmste junimaand sinds het begin van de metingen.



Figuur 2: Gemiddelde temperatuur en hoeveelheid neerslag per dag van 1 maart 2023 tot 1 juli 2023 (Bron: KNMI).

4. Resultaten broedvogels

Op het erf zijn in totaal 35 soorten broedvogels vastgesteld, waaronder 4 Rode Lijst soorten, te weten boerenzwaluw, grauwe vliegenvanger, koekoek en spotvogel. In totaal zijn 82 territoria geteld.

Soort	Aantal broedpaar/ territoria	Rode Lijst
Bergeend	1	
Blauwborst	1	
Boerenzwaluw	1	gevoelig
Boomkruiper	1	
Fazant	1	
Fitis	1	
Gaai	1	
Gekraagde Roodstaart	1	
Grauwe Vliegenvanger	1	gevoelig
Groenling	1	
Grote Bonte Specht	2	
Holenduif	2	
Houtduif	7	
Kauw	1	
Kleine Karekiet	1	
Koekoek	1	kwetsbaar
Koolmees	5	
Krakeend	2	
Meerkoet	2	
Merel	4	
Nijlgans	1	
Pimpelmees	2	
Putter	1	
Spotvogel	1	gevoelig
Spreeuw	11	
Tjiftjaf	5	
Vink	2	
Waterhoen	4	
Wilde eend	3	
Winterkoning	7	
Witte Kwikstaart	2	
Zanglijster	1	
Zwarte Kraai	2	
Zwarte Roodstaart	1	

Soort	Aantal broedpaar/ territoria	Rode Lijst
Zwartkop	2	
TOTAAL SOORTEN	**35**	
TOTAAL TERRITORIA	**82**	

Tabel 2: Broedvogels in het onderzoeksgebied.

Met 35 broedvogelsoorten is Huningaheerd rijk aan broedvogels. Spreeuw was met 11 territoria met afstand de meeste voorkomende broedvogel op het erf. Er zijn 4 nesten met jongen van spreeuwen gevonden. Op de tweede plaats eindigen ex aequo winterkoning en houtduif met 7 territoria. Opvallend is het territorium van een fazant. Op 30 april 2023 is een zingend of baltsend exemplaar waargenomen. Ook het territorium van boomkruiper is bijzonder.

Figuur 3: Bosvogels (links) en struweelvogels (rechts) Huningaheerd

Niet elke waargenomen vogel wordt met de selectiecriteria van Sovon uiteindelijk een territoria. Zo kan het zijn dat een soort eenmaal binnen de broedperiode als individu is aangetroffen, terwijl twee waarnemingen bij elkaar in de buurt nodig zijn om de soort als een territorium te tellen. Sommige waargenomen vogelsoorten staan daarom niet in bovenstaande lijst. Op dit erf geldt dat voor blauwe reiger, bruine kiekendief, buizerd, kuifeend, roodborst, soepeend en sperwer. Op 2 maart zijn 57 kramsvogels geteld, allemaal doortrekkende vogels. Wat betreft de categorie zoogdieren zijn waarnemingen gedaan van haas (26 maart) en ree (13 mei en 5 juni). De aanwezigheid van molshopen indiceert het voorkomen van de mol.

Tot slot werd tijdens het veldbezoek van 13 mei zwavelzwam waargenomen in een wilg bij de paardenwas.

Zwavelzwam in wilg bij paardenwas erf Hunningaheerd, 13 mei 2023

De erfinventarisatie laat zien hoe belangrijk een (boeren)erf is voor de biodiversiteit en de broedvogels van Noord-Groningen. Vanwege de variatie aan beplanting en de verscheidenheid aan biotopen broeden op een erf veel meer soorten dan op akker- of grasland. Het groot aantal territoria van holenbroeders, zoals spreeuw, holenduif, grote bonte specht, koolmees, pimpelmees en boomkruiper, indiceert de aanwezigheid van dikke bomen met (natuurlijke) holten welke voor genoemde vogelsoorten fungeren als geschikte broedlocaties.

5. Literatuur

Kleunen, A. van, Foppen, R. & van Turnhout, C. van, 2017. Basisrapport voor de Rode Lijst Vogels 2016 volgens Nederlandse en IUCN-criteria. Sovon-rapport 2017/34. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Vergeer, J.W., Boele, A., van Bruggen, J. & van Turnhout, J., 2023. Handleiding BMP en Kolonievogels. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Bijlage 1: broedcodes

Overzicht 16 broedcodes

Code 0
Niet-territoriumindicerende waarnemingen buiten geschikt broedbiotoop
Bijv. een groep Rotganzen, een Witgat in een sloot, maar ook: een groep Krakeenden eind maart op een kaal zandgat. Dit type waarnemingen hoeft niet genoteerd te worden, het zijn per definitie geen geldige waarnemingen. Wil je ze toch noteren, hanteer dan de code 0. Ze doen niet mee bij de interpretatie.

Code 1
Volwassen individu in mogelijk broedbiotoop
Geef tenminste bij Wilde Eend, Soepeend, Tafeleend, Kuifeend, Middelste Zaagbek, Fazant, Kievit, Kemphaan, Baardman en Huismus aan of het een mannetje dan wel vrouwtje betreft. Dit heeft bij deze soorten namelijk invloed op de bepaling van het aantal territoria.

Code 2
Zingend of baltsend individu in geschikt broedbiotoop
In bos, struweel, moeras en stedelijk gebied is dit veruit de meest gebruikte broedcode, met name voor zangvogels.

Code 3
Paar in geschikt broedbiotoop
Veel voorkomende code bij niet-zangvogels. Een baltsend paar krijgt code 5.
Let op: een zingende vogel telt bij de clustering vaak zwaarder dan een paartje! Heb je de keuze tussen code 3 of code 2, noteer dan code 2.

Code 5
Baltsend paar in broedbiotoop
Hieronder valt ook voeren van een vrouwtje door het mannetje.

Code 6
Bezoek van een vogel aan een waarschijnlijke nestplaats
Bijv. Huismus die onder dakpan kruipt, Boerenzwaluw die schuur invliegt. Let op: één waarneming van deze code leidt vaak niet direct tot een territorium, terwijl dat vanaf broedcode 7 veelal wel het geval is.

Code 7
Alarmeren/angstkreten of ander gedrag dat wijst op aanwezigheid van nest of jongen
Let op: soms alarmeren vogels zonder dat sprake is van een broedgeval, of zijn de jongen al ver van het nest verwijderd (vooral bij ganzen, eenden, Kievit, Grutto). Dan deze code niet gebruiken; let daarom goed op of de vogel plaatsgebonden is.

Code 9
Transport van nestmateriaal/nestbouw/uithakken of graven nestholte
Achterhaal zo goed mogelijk waar de vogel naar toe vliegt en noteer de waarneming op die plek op de kaart. Voorkom zo dat het territorium uiteindelijk op de plaats komt waar de vogel bijv. takken voor het nest verzamelt.

Code 10
Afleidingsgedrag
De vogel doet alsof hij verlamd/gewond is en lokt zo de waarnemer van het nest. Dit gedrag komt voor bij in open terrein broedende eenden en steltlopers en bij enkele zangvogels, waaronder Rietgors.

Code 11
Pas gebruikt nest of eierschalen
Let op: eierschalen kunnen verplaatst zijn door een predator en van een andere locatie afkomstig zijn. Bij twijfel deze code niet gebruiken.

Code 12
Pas uitgevlogen nestblijvers, of uitgelopen donsjongen van nestvlieders
Gebruik deze code bij nestvlieders alleen bij jonge pullen nabij het vermoedelijke nest. Niet gebruiken voor verzamelplaatsen van pullen, waar bijv. families Grauwe Ganzen of Bergeenden uit de wijde omgeving naartoe trekken, of waar jonge Kieviten en Grutto's opgroeien. Ze kunnen binnen enkele dagen ver van de nestomgeving zijn verwijderd.

Code 13
Gebruikt nest met onbekende inhoud
Bezoek van oudervogel aan een nest waarvan de inhoud niet kan worden vastgesteld, of waarneming van een broedende vogel. Voorbeeld: Zwarte Kraai in broedhouding op nest hoog in boom.

Code 14
Transport voedsel of ontlasting
Vooral bij zangvogels een goed bruikbare code. Niet zomaar gebruiken bij soorten die vaak lange voedselvluchten maken, zoals meeuwen, sterns en IJsvogel. Ook niet gebruiken bij het voeren van reeds uitgevlogen jongen.

Code 15
Nest met eieren

Code 16
Nest met jongen

Codes 4 (territoriumgedrag op dezelfde plaats, vastgesteld minstens 10 dagen uit elkaar) en 8 (vogel met broedvlekken, alleen in de hand vast te stellen) worden in het veld niet gebruikt.

Bijlage 2: soort- en territoriumkaarten

Bergeend 1 territorium

Legenda:

Telgebied

Geldig territorium

Periode:

2023

Telgebied:

56201 Boerenerf Huningaheerd

Sovon

0 0.04 0.08 km

N

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.	datumgrens	afstand
.	X	X	X					2	1	25-4 t/m 20-7	1000

Blauwborst 1 territorium

Legenda:

Telgebied

Geldig territorium

Periode:

2023

Telgebied:

56201 Boerenerf Huningaheerd

Sovon

0 0.04 0.08 km

N

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.	datumgrens	afstand
.	.	X	X	JA					1	25-3 t/m 20-7	300

Boerenzwaluw 1 territorium

Legenda:

Telgebied

Geldig territorium

Periode:

2023

Telgebied:

56201 Boerenerf Huningaheerd

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.	datumgrens	afstand
X	X	X	X						2	10-5 t/m 5-7	1000

Sovon

0 0.04 0.08 km

N

Boomkruiper 1 territorium

Legenda:

Telgebied

Geldig territorium

Periode:

2023

Telgebied:

56201 Boerenerf Huningaheerd

Sovon

0 0.04 0.08 km

N

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.	datumgrens	afstand
.	.	X	X						1	25-1 t/m 25-6	300

Fazant 1 territorium

Legenda:

Telgebied

Geldig territorium

Periode:

2023

Telgebied:

56201 Boerenerf Huningaheerd

Sovon

0 0.04 0.08 km

N

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.	datumgrens	afstand
man	X	X	X						1	25-1 t/m 5-7	300

Fitis 1 territorium

Legenda:

Telgebied

Geldig territorium

Periode:

2023

Telgebied:

56201 Boerenerf Huningaheerd

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.	datumgrens	afstand
.	.	X	X	JA					1	10-4 t/m 5-7	300

Sovon

0 0.04 0.08 km

N

Gaai 1 territorium

Legenda:

Telgebied

Geldig territorium

Periode:

2023

Telgebied:

56201 Boerenerf Huningaheerd

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.	datumgrens	afstand
X	X	X	X						1	25-3 t/m 15-7	500

Sovon

0 0.04 0.08 km

N

Gekraagde Roodstaart 1 territorium

Legenda:

Telgebied

Geldig territorium

Periode:

2023

Telgebied:

56201 Boerenerf Huningaheerd

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.	datumgrens	afstand
.	.	X	X	JA					1	25-4 t/m 5-7	300

Sovon

0 0.04 0.08 km

N

Grauwe Vliegenvanger 1 territorium

Legenda:

Telgebied

Geldig territorium

Periode:

2023

Telgebied:

56201 Boerenerf Huningaheerd

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.	datumgrens	afstand
.	X	X	X	JA					1	10-5 t/m 15-8	300

Sovon

0 0.04 0.08 km

N

Groenling 1 territorium

Legenda:

Telgebied

Geldig territorium

Periode:

2023

Telgebied:

56201 Boerenerf Huningaheerd

Sovon

0 0.04 0.08 km

N

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.	datumgrens	afstand
.	X	X	X						1	10-4 t/m 25-6	300

Grote Bonte Specht 2 territoria

Legenda:

Telgebied

Geldig territorium

Periode:

2023

Telgebied:

56201 Boerenerf Huningaheerd

Sovon

N

0 0.04 0.08 km

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.	datumgrens	afstand
.	X	X	X						1	25-2 t/m 5-7	300

Holenduif 2 territoria

Legenda:

Telgebied

Geldig territorium

Periode:

2023

Telgebied:

56201 Boerenerf Huningaheerd

Sovon

0 0.04 0.08 km

N

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.	datumgrens	afstand
.	X	X	X						1	25-2 t/m 5-8	500

Houtduif 7 territoria

Legenda:

Telgebied

Geldig territorium

Periode:

2023

Telgebied:

56201 Boerenerf Huningaheerd

Sovon

0 0.04 0.08 km

N

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.	datumgrens	afstand
.	X	X	X						1	15-4 t/m 5-8	300

Kauw 1 territorium

Legenda:

Telgebied

Geldig territorium

Periode:

2023

Telgebied:

56201 Boerenerf Huningaheerd

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.	datumgrens	afstand
.	X	X	X						1	25-2 t/m 15-5	300

Sovon

0 0.04 0.08 km

N

Kleine Karekiet 1 territorium

Legenda:

- Telgebied
- Geldig territorium
- Territoria buiten plot (n=1)

Periode:
2023

Telgebied:
56201 Boerenerf Huningaheerd

Sovon

0 0.04 0.08 km

N

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.	datumgrens	afstand
.	.	X	X	JA					1	1-5 t/m 15-7	300

Koekoek 1 territorium

Legenda:

Telgebied

Geldig territorium

Periode:

2023

Telgebied:

56201 Boerenerf Huningaheerd

Sovon

0 0.04 0.08 km

N

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.	datumgrens	afstand
.	.	X	X	JA					1	5-5 t/m 5-7	1000

Koolmees 5 territoria

Legenda:

Telgebied

Geldig territorium

Periode:

2023

Telgebied:

56201 Boerenerf Huningaheerd

Sovon

0 0.04 0.08 km

N

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.	datumgrens	afstand
.	X	X	X						1	10-3 t/m 5-7	300

Krakeend 2 territoria

Legenda:

Telgebied

Geldig territorium

Periode:

2023

Telgebied:

56201 Boerenerf Huningaheerd

Sovon

0 0.04 0.08 km

N

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.	datumgrens	afstand
X	X	X	X						1	15-4 t/m 20-6	1000

Meerkoet 2 territoria

Legenda:

Telgebied

Geldig territorium

Periode:

2023

Telgebied:

56201 Boerenerf Huningaheerd

Sovon

0 0.04 0.08 km

N

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.	datumgrens	afstand
X	X	X	X					2	1	15-4 t/m 15-6	500

Merel 4 territoria

Legenda:

Telgebied

Geldig territorium

Periode:

2023

Telgebied:

56201 Boerenerf Huningaheerd

Sovon

0 0.04 0.08 km

N

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.	datumgrens	afstand
.	.	X	X						1	25-2 t/m 20-7	300

Nijlgans 1 territorium

Legenda:

Telgebied

Geldig territorium

Periode:

2023

Telgebied:

56201 Boerenerf Huningaheerd

Sovon

0 0.04 0.08 km

N

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.	datumgrens	afstand
.	X	X	X						1	10-3 t/m 20-5	1500

Pimpelmees 2 territoria

Legenda:

Telgebied

Geldig territorium

Periode:

2023

Telgebied:

56201 Boerenerf Huningaheerd

Sovon

0 0.04 0.08 km

N

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.	datumgrens	afstand
.	X	X	X						1	10-3 t/m 5-7	300

Putter 1 territorium

Legenda:

Telgebied

Geldig territorium

Periode:

2023

Telgebied:

56201 Boerenerf Huningaheerd

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.	datumgrens	afstand
.	.	X	X						1	25-3 t/m 20-7	300
X	X	.	.						1	5-5 t/m 20-7	500

Sovon

N

0 0.04 0.08 km

Spotvogel 1 territorium

Legenda:

Telgebied

Geldig territorium

Periode:

2023

Telgebied:

56201 Boerenerf Huningaheerd

Sovon

0 0.04 0.08 km

N

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.	datumgrens	afstand
.	.	X	X	JA					1	5-5 t/m 20-7	300

Spreeuw 11 territoria

Legenda:

Telgebied

Geldig territorium

Periode:

2023

Telgebied:

56201 Boerenerf Huningaheerd

Sovon

0 0.04 0.08 km

N

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.	datumgrens	afstand
.	X	X	X						1	25-3 t/m 5-6	300

Tjiftjaf 5 territoria

Legenda:

Telgebied

Geldig territorium

Periode:

2023

Telgebied:

56201 Boerenerf Huningaheerd

Sovon

0 0.04 0.08 km

N

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.	datumgrens	afstand
.	.	X	X	JA					1	5-4 t/m 25-7	300

Vink 2 territoria

Legenda:

Telgebied

Geldig territorium

Periode:

2023

Telgebied:

56201 Boerenerf Huningaheerd

Sovon

0 0.04 0.08 km

N

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.	datumgrens	afstand
.	.	X	X						1	15-4 t/m 25-7	300

Waterhoen 2 territoria

Legenda:

Telgebied

Geldig territorium

Periode:

2023

Telgebied:

56201 Boerenerf Huningaheerd

Sovon

0 0.04 0.08 km

N

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.	datumgrens	afstand
X	X	X	X						1	15-4 t/m 20-6	300

Wilde Eend 3 territoria

Legenda:

- Telgebied
- Geldig territorium
- Territoria buiten plot (n=1)

Periode:
2023

Telgebied:
56201 Boerenerf Huningaheerd

Sovon

0 0.04 0.08 km

N

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.	datumgrens	afstand
man	X	X	X						1	25-3 t/m 15-5	1000

Winterkoning 7 territoria

Legenda:

Telgebied

Geldig territorium

Periode:

2023

Telgebied:

56201 Boerenerf Huningaheerd

Sovon

0 0.04 0.08 km

N

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.	datumgrens	afstand
.	.	X	X						1	25-1 t/m 25-7	300

Witte Kwikstaart 2 territoria

Legenda:

Telgebied

Geldig territorium

Periode:

2023

Telgebied:

56201 Boerenerf Huningaheerd

Sovon

0 0.04 0.08 km

N

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.	datumgrens	afstand
X	X	X	X					2	1	25-3 t/m 15-7	300

Zanglijster 1 territorium

Legenda:

Telgebied

Geldig territorium

Periode:

2023

Telgebied:

56201 Boerenerf Huningaheerd

Sovon

0 0.04 0.08 km

N

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.	datumgrens	afstand
.	.	X	X						1	15-4 t/m 5-7	300

Zwarte Kraai 2 territoria

Legenda:

Telgebied

Geldig territorium

Periode:

2023

Telgebied:

56201 Boerenerf Huningaheerd

Sovon

0 0.04 0.08 km

N

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.	datumgrens	afstand
.	X	X	X						1	25-2 t/m 5-7	500

Zwarte Roodstaart 1 territorium

Legenda:

Telgebied

Geldig territorium

Periode:

2023

Telgebied:

56201 Boerenerf Huningaheerd

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.	datumgrens	afstand
.	.	X	X	JA					1	15-4 t/m 15-7	300

Sovon

0 0.04 0.08 km

N

Zwartkop 2 territoria

Legenda:

Telgebied

Geldig territorium

Periode:

2023

Telgebied:

56201 Boerenerf Huningaheerd

Sovon

0 0.04 0.08 km

N

geldige waarnemingen				normbezoeken				minimaal binnen			fusie-
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	datumg.	datumgrens	afstand
.	.	X	X	JA					1	10-4 t/m 25-7	300

WIERDE & DIJK

JUBILEUM 25 jaar

VERENIGING VOOR AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER